



PRÀCTIQUES RECOMANADES

Divendres 7 d'Abril del 2017

Cuc del raïm. Confusió sexual:

En aquelles zones on s'utilitzi la tècnica de **confusió sexual**, si encara no s'han posat els difusors, els han de col·locar els més aviat possible, tenint present les següents recomanacions:

- Els difusors han de col·locar-se just a **l'inici de la primera generació**, quan es produeixen les primeres captures, actualment ja s'han trobat a la zona primerenca, zona mitjana s'haurien de col·locar a principis de la setmana vinent i posteriorment la zona tardana.
- S'aconsella col·locar els difusors uniformement dins la parcel·la, posant sempre el nombre de difusors per hectàrea que recomana la casa (500 difusors/ha).
- El nombre de ceps a deixar entre difusor i difusor dependrà del marc de plantació de la vinya i caldrà calcular-ho prèviament.
- Les vores de la zona de confusió s'han de reforçar.
- És necessari tenir supervisió tècnica per verificar el seu funcionament, principalment durant els primers anys.
- Cal manipular els difusors amb guants ja que, tot i que no presenten toxicitat, poden ser irritants en contacte amb les mucoses.

Cendrosa:

El primer tractament és molt important per controlar la malaltia des del principi de la brotada, per això és necessari fer-lo quan aquesta brotada arribi als 12-15 cm de longitud o amb 5 fulles desplegades.

Informació facilitada per l'ADV de la D.O.Q Priorat. Per qualsevol aclariment es poden adreçar al CRDOQPriorat 977-839495 o al mòbil de l'ADV 638894312

Avisos realitzats en col·laboració entre Sanitat Vegetal i les Agrupacions de Defensa vegetal de Tarragona.

ADV DOQ PRIORAT

c/ Major, 2
43737 Torroja del Priorat
977 839495/638894312
adv@doqpriorat.org