

INFORME COLLITA 2010

FENOLOGIA

L'any va començar fred, amb un hivern que es va fer llarg, amb presència de neu i força plujós, factors que van afavorir una brotada ben decidida i un bon creixement vegetatiu durant el primer recorregut de la nova temporada dels ceps. L'aigua va ser present en tots els mesos primaverals i va continuar havent-hi dies de pluja al Juny i a l'Agost quan, a més a més, es va produir una forta tempesta amb pedra que va afectar algunes parts de la zona primerenca. En general no ha estat un any de temperatures elevades i exceptuant la darrera setmana d'Agost, l'estiu s'ha caracteritzat per ser força temperat, amb una humitat relativa de mitjana gens baixa; només al Juliol s'ha mantingut un comportament que podríem considerar-lo habitual però amb tot, sense temperatures extremes. La tardor va començar amb les nits força fredes i amb pluja, mentre que a l'Octubre es va imposar un temps típicament tardoral amb un episodi de pluja abundant concentrada en quatre dies just abans d'arribar a l'equador del mes.

El despertar de la vinya en totes les varietats va ser tardana, amb 10-15 dies de retard respecte d'altres anys; a primers d'Abril es generalitzava la brotada en garnatxes a la zona primerenca i gradualment es veien verdejar les vinyes a la resta del territori. Es comencen a veure raïms florits l'última setmana de Maig a la zona primerenca, avançant durant els primers dies de Juny per la zona mitja i completant la floració durant la primera quinzena de mes a la zona tardana. El tancament del raïm queda situat cap a mitjans de Juliol en Garnatxa i Sirà a la zona mitja i en pocs dies i gràcies a les elevades temperatures, també es completa a les altres zones. A finals de Juliol es comencen a veure raïms verolats a les terres més calentes i en varietats més primerenques com ara Merlot i Sirà i amb poca diferència de dies ja es troben carinyenes tintades a la zona mitja de la DOQ; a mesura que l'Agost avança, de manera molt espaiada i relentitzada, el verol s'acaba imposant també a la zona més tardana. En tots els estadis fenològics es va mantenint aquesta setmana i mitja de diferència -que ja va marcar la brotada- respecte a anyades anteriors.

SANITAT

Tant pel que fa a la planta com pel que fa al raïm sanitàriament ha estat un any bo, caracteritzat per l'absència de tractaments donada la poca incidència de plagues. Només a finals de Juliol, just abans del verol, es veu un augment de cendrosa provocat per les notòries condicions de calor i d'elevada humitat existents en aquell moment. En relació al mildiu, el 21 de Maig a Gratallops i el 25 a Porrera es localitzen les primeres taques; malgrat això i l'alarma inicial produïda per la proximitat de la floració no hi ha contaminacions significatives, de manera que fins que les pluges de tardor no agafen protagonisme no es tornen a veure alguns símptomes a les fulles terminals dels sarments en els indrets on el risc d'aquesta afectació fúngica acostuma a ser més alt. Pel que fa al cuc del raïm, cal dir que tant la volada com la posta de la segona i tercera generació han estat molt fluixes i per últim referenciar que la incidència de mosquit verd a les trampes de control ha estat gairebé nul·la.

VEREMA

El tret de sortida de la verema es va donar a finals d'Agost amb alguna varietat primerenca a Gratallops i a les solanes del Molar. Fou a primers de Setembre quan es comença a veremar majoritàriament Garnatxa, generalitzant-se de meitat de mes en endavant en qualsevol varietat i continuant de valent a començaments d'Octubre. Les pluges del pont del Pilar marquen un compàs d'espera i durant la segona quinzena de mes es continua amb les varietats més tardanes a les zones més altes i fresques del territori, tot i que no és fins a mitjans de Novembre que s'acaben de veremar algunes carinyenes a Poboleda primer i a Porrera després. En general la maduració ha estat lenta degut al contrast de temperatures entre el dia i la nit i el raïm s'ha collit en un estat sanitari força bo, arribant als 4,8 milions de kilos al tancament de la campanya. La Collita es valora de molt bona qualitat tant pel que fa a les varietats blanques com pel que fa a les negres.

La campanya de verema s'ha sotmès als controls dels veedors del Consell Regulador amb l'objectiu de fer la vigilància referent a la parcela veremada i la seva entrada del raïm al celler, realitzant controls de camp i la seva corresponent entrada i documentació als cellers. Concretament s'han efectuat un total de 631 controls de verema.

Les dades de la collita s'han tramès en forma de pesades pel Sistema de la Targeta Única introduït pel DAR, materialitzant-se en un total de 3.557 trameses de pesada que signifiquen que acaben entrant 4.865.669 Kg de raïm.